Stroomdiagram voor de huisarts
bij vermoeden van gehoorverlies bij volwassenen

Uw acties | Verwijzing
Bevindingen | Geen actie nodig

U heeft een vermoeden dat uw patiënt gehoorverlies vertoont

Uw patiënt spreekt u spontaan aan over zijn/haar gehoorverlies

Checklist: 'Gehoorverlies herkennen'
Wordt uw vermoeden bevestigd?

Nee → U hoeft niet door te verwijzen

Ja → **Voer otoscopie uit, bespreek het gehoorverlies en de mogelijke negatieve gevolgen van onbehandeld gehoorverlies**

Plots en/of snel erger wordend of fluctuerend gehoorverlies, uni-of bilateraal **snelle interventie** cruciaal

- Ja → **Dringend** doorverwijzen naar **spoed**
- Nee ↓

Unilateraal of significant asymmetrisch gehoorverlies, tinnitus of vertigo

- Ja → **Direct** doorverwijzen naar **NKO-arts**
- Nee ↓

Behandelbaar door huisarts?

- Ja → Start de behandeling
- Nee → OF ↓

of naargelang resultaat gehoorscreening:

Score: > 70	**De spraak-in-ruis, 'hear-WHO' zelftest**	Score: ≤ 70
	of	
Score: 0 - 8	**De Auditieve Screening Vragenlijst voor Volwassenen**	Score: 10 - 40

→ Doorverwijzen om het gehoor te laten testen door een **NKO-arts**, of een **audioloog/audicien** in een hoorcentrum