Stroomdiagram voor eerstelijnszorgverleners
bij vermoeden van gehoorverlies bij volwassenen

Uw acties	Verwijzing
Bevindingen	Geen actie nodig

Checklist: 'Gehoorverlies herkennen'
Wordt uw vermoeden bevestigd?

U heeft een vermoeden dat uw patiënt gehoorverlies vertoont

Uw patiënt spreekt u spontaan aan over zijn/haar gehoorverlies

Nee

U hoeft niet door te verwijzen

Ja

Bespreek het gehoorverlies en de mogelijke negatieve gevolgen van onbehandeld gehoorverlies

Plots en/of snel erger wordend of fluctuerend gehoorverlies, uni-of bilateraal **snelle interventie** cruciaal

Ja → **Dringend** doorverwijzen naar **huisarts**

Nee

Indien uit de **bespreking** gehoorverlies blijkt

Of → Doorverwijzen naar **huisarts**

of

Doorverwijzen om het gehoor te laten testen naar een **NKO-arts of hoorcentrum**

Of

of naargelang resultaat gehoorscreening:

Score: > 70	**De spraak-in-ruis, 'hear-WHO' zelftest**	Score: ≤ 70
	of	
Score: 0 - 8	**De Auditieve Screening Vragenlijst voor Volwassenen**	Score: 10 - 40